

19 мая 2025 г.
Обзор промысла трески
12–18 мая 2025 г.
и прогноз на следующую неделю
вед.н.с., к.б.н. Савин А.Б.
(лаб. Биологических ресурсов
Арктических и ДВ морей)

Треска (Западно-Беринговоморская зона)

Согласно располагаемым нами материалам с 12 по 18 мая текущего года, треску в своих уловах ежедневно отмечали до 7-и траулеров и до 28-и ярусоловов.

Лов трески производился на изобатах от 70 до 320 м при средневзвешенной относительно величин уловов глубине, равной 165,6 м.

Траулеры прилавливали треску на олюторско-наваринском шельфе и склоне от 171°31,1'E до района б. Глубокой, а также в районе от б. Анастасии до б. Дежнева (рис. 1). Всего ими добыто 140 т трески в прилове за 45 судосутки, что составило 3,10 т/судосутки. Треска прилавливалась в объёме 13,3 % от общего улова всех видов. В прошлом году (2024 г.) в аналогичную семидневку уловы были намного меньше, составляя 0,87 т/судосутки, а среднегодовое (1998–2024 гг.) показателем было вдвое большим – 6,54 (рис. 2).

Ярусоловы промыслили треску у м. Олюторский, а также на олюторско-наваринском шельфе и склоне от района б. Глубокая до 176°55,9'E и от 178°08,7'E до разделительной линии ИЭЗ Россия/США. Всего ими добыто 936 т трески за 155 судосутки, что составило всего 6,04 т/судосутки. Треска являлась целевым объектом промысла и занимала 89,7 % вылова. В прошлом году – в рассматриваемую семидневку, средний улов был немногим меньше, равнялся 5,68 т/судосутки, при существенно большем среднегодовом показателе – 10,48 т/судосутки.

Нарастающий вылов трески на конец рассматриваемой недели, по уточнённым данным достиг 11180 т (рис. 3). В прошлом (2024 г.) году он был существенно ниже, равнялся 6182 т, а в позапрошлом (2023 г.) году незначительно выше – 12005 т. Среднегодовое (1998–2024 гг.) показателем было ниже нынешнего уровня – 7895 т.

Прилов белокорого палтуса на промысле трески в прошедшую неделю достиг 15,018 т при том, что тралами его выловлено 0,205 т и ярусами – 14,813 т. Накопленный с начала года прилов к треске составил 203,081 т.

Ожидается, что на следующей неделе основные скопления трески будут предположительно локализованы по центральным глубинам 140–175 м на олюторско-наваринском шельфе от м. Олюторский на западе, до долготы м. Наварин на востоке и далее на юго-восток – до разделительной линии ИЭЗ Россия/США.

Среднесуточный прилов трески траулерами предположительно не превысит 5 т/судосутки, а уловы ярусоловов составят около 5–9 т/судосутки.




Рисунок 1 – Распределение промысла трески в северо-западной части Берингова моря (Западно-Берингоморская зона) за период 12–18.05.2025 г.: точками отмечены места ловов




Рисунок 2 – Сравнение средненедельных показателей уловов трески на судосутки для различных промысловых орудий в Западно-Беринговоморской зоне текущего года (2025 г.) со среднееголетними (1998–2024 гг.) и прошлогодними (2024 г.) показателями




Рисунок 3 – Динамики текущего года (2025 г.), среднееголетнего (1998–2024 гг.), прошлогоднего (2024 г.) и позапрошлого (2023 г.) нарастающих выловов трески в Западно-Беринговоморской промысловой зоне